

Underlag till växnäringsbalansberäkning

IN

Handelsgödsel	
Sort	Kg
Stallgödsel	
Sort	Kg
Krafftoder	
Sort	Kg
Mineralfoder	
Sort	Kg
Utsäde	
Sort	Kg
Grovfoder	
Sort	Kg
Spannmål	
Sort	Kg
Livdjur	
Sort	Kg
Övrigt	
Sort	Kg

UT

Slaktdjur, mjölk, ägg	
Sort	Kg
Spannmål	
Sort	Kg
Potatis, Rotfrukter	
Sort	Kg
Övriga växtprodukter	
Sort	Kg
Stallgödsel	
Sort	Kg
Fodermedel	
Sort	Kg
Övrigt	
Sort	Kg

Uppgifter för kvävefixering

OBS! Alla ts-skördar skall anges i bruttoskördar (före skördeföruster som kan vara upp till 20 % av skörden)

Klöverhalt anges som vikts-% i skörden, inte i utsädet. Vid låga klöverhalter blir halten lätt övervärderad. Som ett hjälpmedel presenteras här en undersökning från Danmark.

Visuellt bedömd klöverhalt, %	10-29	30-49	>50
Klöverhalt, vikts-% av ts-skörd	3-16	17-29	>50

Baljväxtvallar

Vall, typ	Areal ha	Skörd kg ts/ha	Klöverhalt %	Kvävegiva kg/ha
Klöverfrövall (grönmassa)				
Vall I 1:a skörd				
Vall I 2:a skörd				
Vall I 3:e skörd				
Vall II och äldre 1:a skörd				
Vall II och äldre 2:a skörd				
Vall II och äldre 3:e skörd				

Trindsäd till mogen skörd

Gröda	Areal ha	Skörd kg/ha vid 14 % vh	Baljväxtandel %	Proteinhalt %
Bruna bönor				
Havre/ärt				
Åkerbönor				
Ärter				

Grönfoder med baljväxter

Gröda	Areal ha	Skörd kg ts/ha	Baljväxtandel %
Havre/ärt			

Konservärter

Gröda	Areal ha	Skörd gröna ärter/ha
Konservärter		